

Les fractions

Cours

I. Le nombre fraction

1. La fraction, en tant que quotient

Définition

a et b désignent deux nombres entiers, avec $b \neq 0$. Le **quotient** de a par b est le nombre qui, multiplié par b, donne a. On le note $\frac{a}{b}$: a est le **numérateur**, b est le **dénominateur**.

Autrement dit : $a \div b = \frac{a}{b}$ et $b \times \frac{a}{b} = a$.

Exemple 1 : $3 \div 4$
 $= \frac{3}{4}$
 $= 0,75$

Vérification : $4 \times \frac{3}{4}$
 $= \frac{4 \times 3}{4}$
 $= \frac{12}{4}$
 $= 3$

2. La fraction, un nombre exact

À retenir

Certains quotients n'ont pas d'écriture décimale exacte : $2 \div 3 = 0,666\ 6\dots$ (les 6 se répètent sans fin). Une écriture décimale comme 0,67 n'est qu'une **valeur approchée**.

La fraction $\frac{2}{3}$ est donc l'**écriture exacte** de ce nombre : on la conserve telle quelle dans les calculs pour obtenir un résultat exact.

Exemple : $3 \times \frac{2}{3}$
 $= \frac{3 \times 2}{3}$
 $= \frac{6}{3}$
 $= 2$

Avec la valeur approchée :

$$3 \times 0,67$$

$$= 2,01$$

Le résultat n'est pas exact : on aurait dû trouver 2.

3. Fractions égales

Propriété

On ne change pas la valeur d'une fraction quand on **multiplie** ou quand on **divise** son numérateur et son dénominateur par un même nombre k non nul :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

$$\begin{aligned} \text{Multiplier : } \frac{3}{4} \\ &= \frac{3 \times 5}{4 \times 5} \\ &= \frac{15}{20} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Diviser : } \frac{18}{24} \\ &= \frac{18 \div 6}{24 \div 6} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Simplifier une fraction — fraction irréductible

Simplifier une fraction, c'est écrire une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur plus petits, en les divisant par un diviseur commun (remarque : les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9, 10 aident à les trouver).

Lorsqu'on ne peut plus simplifier, la fraction est dite **irréductible**.

$$\begin{aligned} \text{Exemple : } \frac{42}{56} \\ &= \frac{42 \div 2}{56 \div 2} \text{ par 2} \\ &= \frac{21}{28} \\ &= \frac{21 \div 7}{28 \div 7} \text{ par 7} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

II. Comparer et ordonner des fractions

Règle 1 — Même dénominateur

Si deux fractions ont le **même dénominateur**, la plus grande est celle qui a le **plus grand numérateur**.

$$\text{Exemple : } \frac{7}{9} > \frac{4}{9} \text{ car } 7 > 4.$$

Règle 2 — Même numérateur

Si deux fractions ont le **même numérateur** (non nul), la plus grande est celle qui a le **plus petit dénominateur** : on partage en moins de parts, donc chaque part est plus grande.

$$\text{Exemple : } \frac{3}{5} > \frac{3}{8} \text{ car } 5 < 8.$$

Comparer une fraction à 1

Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est inférieure à 1 ; s'il est plus grand, elle est supérieure à 1 ; s'ils sont égaux, elle est égale à 1.

Exemple : $\frac{7}{8} < 1$ car $7 < 8$; $\frac{9}{8} > 1$ car $9 > 8$; $\frac{8}{8} = 1$.

Méthode — Dénominateurs différents

On écrit les deux fractions avec un **même dénominateur** (dénominateur commun), puis on applique la règle 1. Le dénominateur commun le plus simple est le plus petit multiple commun des dénominateurs (PPCM).

Cas 1 : 12 est un multiple de 4.

$$\begin{aligned} & \frac{3}{4} \\ &= \frac{3 \times 3}{4 \times 3} \\ &= \frac{9}{12} \\ & \frac{9}{12} > \frac{7}{12} \text{ donc } \frac{3}{4} > \frac{7}{12} \end{aligned}$$

Cas 2 : multiples de 6 : 6, 12, 18, **24** ;

multiples de 8 : 8, 16, **24**.

$$\begin{aligned} & \frac{5}{6} & \frac{7}{8} \\ &= \frac{5 \times 4}{6 \times 4} &= \frac{7 \times 3}{8 \times 3} \\ &= \frac{20}{24} &= \frac{21}{24} \\ & \frac{20}{24} < \frac{21}{24} \text{ donc } \frac{5}{6} < \frac{7}{8} \end{aligned}$$

Ordonner des fractions

Ranger dans l'**ordre croissant**, c'est ranger du plus petit au plus grand (symbole $<$) ; dans l'**ordre décroissant**, du plus grand au plus petit (symbole $>$).

Exemple : ranger $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{7}{12}$; $\frac{1}{2}$ dans l'ordre croissant. Dénominateur commun : 12.

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12} ; \frac{5}{6} = \frac{10}{12} ; \frac{1}{2} = \frac{6}{12} \text{ donc } \frac{1}{2} < \frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{5}{6}$$

III. Les quatre opérations

1. Additionner et soustraire

Règle

Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de **même dénominateur**, on additionne (ou on soustrait) les numérateurs et on **garde le dénominateur** :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Si les dénominateurs sont **différents**, on commence par écrire les fractions avec un dénominateur commun (si possible le PPCM des dénominateurs).

Même dénominateur

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{4}{9} + \frac{2}{9} \\ &= \frac{4+2}{9} \\ &= \frac{6}{9} \\ &= \frac{2}{3} \text{ par } 3 \end{aligned}$$

12 est un multiple de 4

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & \frac{7}{12} - \frac{1}{4} \\ &= \frac{7}{12} - \frac{1 \times 3}{4 \times 3} \\ &= \frac{7}{12} - \frac{3}{12} \\ &= \frac{4}{12} \\ &= \frac{1}{3} \text{ par } 4 \end{aligned}$$

PPCM(6 ; 4) = 12

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad & \frac{5}{6} + \frac{3}{4} \\ &= \frac{5 \times 2}{6 \times 2} + \frac{3 \times 3}{4 \times 3} \\ &= \frac{10}{12} + \frac{9}{12} \\ &= \frac{19}{12} \end{aligned}$$

2. Multiplier

Règle

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les **numérateurs entre eux** et les **dénominateurs**

entre eux : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

. **Conseil :** on simplifie le plus tôt possible, en décomposant avant d'effectuer les produits.

Sans simplification

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} \\ &= \frac{2 \times 4}{3 \times 5} \\ &= \frac{8}{15} \end{aligned}$$

En simplifiant avant de calculer

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & \frac{6}{35} \times \frac{14}{9} \\ &= \frac{6 \times 14}{35 \times 9} \\ &= \frac{2 \times 3 \times 2 \times 7}{5 \times 7 \times 3 \times 3} \quad \text{on décompose} \\ &= \frac{2 \times 2}{5 \times 3} \quad \text{par 3 et par 7} \\ &= \frac{4}{15} \end{aligned}$$

Cas particulier : Un nombre entier n peut s'écrire $\frac{n}{1}$ donc $n \times \frac{a}{b} = \frac{n \times a}{1 \times b} = \frac{n \times a}{b}$

exemple : $5 \times \frac{2}{7} = \frac{5 \times 2}{7} = \frac{10}{7}$

Prendre une fraction d'une quantité

Prendre $\frac{a}{b}$ d'un nombre (ou d'une fraction), c'est **multiplier** ce nombre par $\frac{a}{b}$.

Le mot « de » se traduit par l'opérateur « $\times$ ».

$$\begin{aligned} \text{Les } 2/3 \text{ de } 45 \text{ L : } & \frac{2}{3} \times 45 \\ &= \frac{2 \times 45}{3} \\ &= \frac{2 \times 3 \times 15}{3} \\ &= 30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Les } 3/4 \text{ de } 2/5 : & \frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \\ &= \frac{3 \times 2}{4 \times 5} \\ &= \frac{3 \times 2}{2 \times 2 \times 5} \\ &= \frac{3}{10} \quad \text{par 2} \end{aligned}$$

Les $\frac{2}{3}$ de 45 L représentent donc 30 L.

3. Diviser

Inverse d'un nombre

Deux nombres sont **inverses** l'un de l'autre lorsque leur produit est égal à 1.

L'inverse de $\frac{a}{b}$ ($a \neq 0$ et $b \neq 0$) est $\frac{b}{a}$. L'inverse de 5 est $\frac{1}{5}$.

Exemple :

$$\begin{aligned} & \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} \\ &= \frac{3 \times 4}{4 \times 3} \\ &= \frac{12}{12} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Diviser par une fraction

Diviser par un nombre non nul revient à **multiplier par son inverse** : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

Une division peut aussi s'écrire comme une « fraction de fractions » : la **grande barre**, placée au niveau du signe =, signifie « divisé par ».

a)

$$\begin{aligned} & \frac{3}{4} \div \frac{5}{2} \\ &= \frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \\ &= \frac{3 \times 2}{4 \times 5} \\ &= \frac{3 \times 2}{2 \times 2 \times 5} \\ &= \frac{3}{10} \text{ par } 2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} & \frac{2}{3} \div \frac{5}{6} \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{6}{5} \\ &= \frac{2 \times 6}{3 \times 5} \\ &= \frac{2 \times 2 \times 3}{3 \times 5} \\ &= \frac{4}{5} \text{ par } 3 \end{aligned}$$

4. Enchaîner les calculs : priorités opératoires ("PaMDAS !")

Règle

Dans un calcul, on effectue d'abord les calculs **entre Parenthèses**, puis les **Multiplications et Divisions**, enfin les **Additions et Soustractions** (de gauche à droite).

$$\text{a) } \frac{1}{3} + \frac{5}{3} \times \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{5 \times 2}{3 \times 5} \quad \times \text{ prioritaire}$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \quad \text{par 5}$$

$$= \frac{3}{3}$$

$$= 1$$

$$\text{b) } \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \times \frac{8}{9}$$

$$= \left(\frac{2}{4} + \frac{1}{4} \right) \times \frac{8}{9} \quad () \text{ d'abord}$$

$$= \frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$$

$$= \frac{3 \times 8}{4 \times 9}$$

$$= \frac{3 \times 4 \times 2}{4 \times 3 \times 3}$$

$$= \frac{2}{3} \quad \text{par 3 et 4}$$